

INDICAZIONI ESAMI FISIOPATOLOGIA

MANOMETRIA ESOFAGEA AD ALTA RISOLUZIONE

- Se possibile sospendere i farmaci in grado di interferire con la motilità (miolitici, calcio-antagonisti, nifedipina, nitro-derivati, ansiolitici) da almeno 24 ore.
- Necessita di digiuno da 12 ore (fino a 24 ore in caso di megaesofago/acalasia).
- Deve aver eseguito un'esofagogastroduodenoscopia da meno di un anno. In alternativa, Rx esofago-stomaco-duodeno.
- Deve portare tutta la documentazione in suo possesso (esami di laboratorio, cartelle cliniche, endoscopie, ecc.).

PH-METRIA/PH-IMPEDENZIOMETRIA DELLE 24 ORE

- Se possibile sospendere i farmaci in grado di interferire con la motilità (miolitici, calcio-antagonisti, nifedipina, nitro-derivati) da almeno 24 ore ed i farmaci antisecretori (esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, omeprazolo, ranitidina e simili) da almeno 5 giorni.
- Necessita di digiuno da 12 ore (fino a 24 ore in caso di megaesofago/acalasia).
- Deve aver eseguito un'esofagogastroduodenoscopia da meno di un anno. In alternativa, Rx esofago-stomaco-duodeno.
- Deve avere eseguito manometria esofagea.
- Deve portare tutta la documentazione in suo possesso (esami di laboratorio, cartelle cliniche, endoscopie, ecc.).

MANOMETRIA ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE

- Praticare un clistere evacuativo di fosfato ipertonico di circa 130cc (ad es. Sorbiclis, Clismalax) almeno 2 ore prima dell'indagine.
- Deve evitare l'uso di creme, unguenti anali dalla sera precedente l'indagine.
- Non mettere tampax.
- Non è necessario il digiuno.
- Deve portare tutta la documentazione in suo possesso (esami di laboratorio, cartelle cliniche, endoscopie, ecc.).