

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA E MEDICINE SPECIALISTICHE
U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Direttore DR. ROBERTO FAGGIANI
Padiglione Flajani 2° piano

**Preparazione per COLONSCOPIA AD ALTO VOLUME
con SELG – ESSE o COLIREI o ISOCOLAN**

Indicata per pazienti con alvo irregolare, stipsi o che hanno già eseguito l'esame con preparazione a basso volume, risultata inefficace.

Acquistare uno dei tre prodotti in farmacia e PREPARARE LA SOLUZIONE ATTENENDOSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI NELLA SCATOLA.

DIETA: TRE giorni prima dell'esame è vietata frutta, verdura e legumi. **Si possono mangiare:** carne, pesce, uova, formaggi, latticini, patate e carote lesse, (pane e pasta in modica quantità, a scelta riso, crackers e grissini)

Nella preparazione, per liquidi si intendono: the', bevande zuccherate, succhi di frutta senza polpa, camomilla, tisane

N.B. Per i pazienti che presentano stipsi, si consiglia di utilizzare una preparazione di 5 giorni precedenti l'esame con REDIPeG o prodotti similari.

□ **Appuntamento la mattina dalle 8:00 alle 10:00**

IL GIORNO PRIMA: Pranzo leggero entro le ore 15.00. Cena leggera entro le 19:00

Ore 18:00:

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

Ore 21:00:

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

□ **Appuntamento la mattina dalle 10:30 alle 14:00**

IL GIORNO PRIMA: Pranzo leggero entro le ore 15.00. Cena leggera entro le 20:00

Ore 22:00

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

Ore 06:00:

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

□ **Appuntamento il pomeriggio dalle 14.30 in poi**

IL GIORNO PRIMA: Pranzo leggero (semolino, brodo di carne, pastina) Cena leggera (semolino, brodo di carne, pastina)

Ore 06:00

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

Ore 09:00:

Bere DUE LITRI di soluzione in DUE ORE (1 bicchiere ogni 15 / 20 minuti) + mezzo litro di liquidi

Presentarsi accompagnati poiché è vietato guidare per 12 ore successive alla sedo – analgesia

Portare impegnativa con cui si è prenotato l'esame endoscopico ed il numero di prenotazione del Recup

Se sono presenti patologie cardiache, per l'esecuzione dell'esame è necessaria la relazione di una visita cardiologica recente o ECG

La terapia abituale può però essere sempre assunta con un piccolo sorso d'acqua.

Se in terapia con antiaggreganti o anticoagulanti attenersi alle seguenti indicazioni, se non diversamente indicato dal Medico Endoscopista che eseguirà l'esame:

- **Coumadin e Sintrom:** contattare il cardiologo di fiducia per la sospensione e/o sostituzione;

- **Nuovi Anticoagulanti Orali:** non assumere la compressa la mattina dell'esame.

Per tutte le altre terapie, contattare il medico di base per informazioni o chiarimenti